

## COVID-19 ouverture progressive de l'école

### Annexe 12

#### Leitfaden zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern der DST

#### Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal

##### Grundsatz

1. Bei allgemeinen Symptomen (banaler Infekt) **ohne Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens** bzw. mit nur leichten Symptomen (z.B. nur Schnupfen, leichter Husten, leichte Halsschmerzen) oder bei bekannten Symptomen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) ist ein Besuch des Kindergartens/der Schule möglich
2. Im Zweifel Kontaktaufnahme mit der Schule und das Kind zu Hause behalten.

#### Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?



#### Vorstellung beim Arzt, der dann über COVID-19-Test entscheidet:

##### Wenn Testung vom Arzt angeordnet wird:

Kind bleibt bis zum Ergebnis zu Hause; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen

##### Wenn KEINE Testung vom Arzt angeordnet wird\* $\Delta$ :

Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist; Entscheidung des Arztes der Schule mitteilen

##### Test positiv:

- Schule unverzüglich informieren
- Kind bleibt für 7 Tage in häuslicher Quarantäne (10 Tage, bei brasilianischer (2) oder südafrikanischer (3) Variante)
- Kind kann danach wieder zur Schule, wenn es 48 Stunden symptomfrei ist und
- für die Varianten 2 und 3 ein negativer Test vorliegt

oder

##### Test negativ:

- Schule unverzüglich informieren
- Kind kann wieder zur Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist

## Wie reagiere ich, wenn ...

<p>1. ... ein Familienmitglied aufgrund von Krankheitssymptomen oder auf Anordnung des Arztes/der Behörden auf Corona getestet wird?</p> <p style="text-align: center;">  <b>Test positiv</b> </p> <p style="text-align: center;">  <b>Test negativ</b> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Schule informieren</li> <li>➤ Das Kind bleibt zu Hause, bis das Ergebnis vorliegt; Schule über das Ergebnis in jedem Fall informieren</li> <li>➤ Kind bleibt 14 Tage oder länger zu Hause, wenn das Kind mit der infizierten Person unter einem Dach lebt</li> <li>➤ <b>Ist ein Familienmitglied positiv auf eine der Varianten (brasilianisch, südafrikanisch) getestet worden, Rückkehr nur mit negativem Testergebnis des Kindes</b></li> <li>➤ <b>Kind kommt wieder in die Schule</b></li> </ul>
<p>2. ... ein Geschwisterkind Symptome hat?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Schule informieren</li> <li>➤ Alle Kinder der Familie vorsichtshalber zu Hause lassen</li> <li>➤ Ergebnis des eventuellen Corona-Testes beim Geschwisterkind abwarten, dann weiter wie bei 1.</li> </ul>
<p>3. ... ein Verdachtsfall bei Arbeitskollegen des Vaters/ der Mutter vorliegt?</p> <p style="text-align: center;">  <b>Test positiv beim Arbeitskollegen und wenn Elternteil ebenfalls getestet werden muss</b> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Kind muss nicht zu Hause bleiben, liegt im Ermessen der Eltern</b></li> <li>➤ dann wie 1</li> </ul>



\* Kindergartenkinder mit COVID-Krankheitssymptomen müssen, wenn keine Testung vom Arzt angeordnet wird, mindestens 7 Tage zu Hause bleiben.